

دانستنی های لازم درباره
واکسن کووید ۱۹ و تزریق آن



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان بهداشت
مركز تزریق واکسن - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پیشگیری از ابتلای به کووید ۱۹ پس از تزریق واکسن

اگرچه واکسن کووید ۱۹ به میزان بالایی از ابتلای به کووید ۱۹ پیشگیری می کند، ولی باید به دلایل زیر تا چند وقت اصول فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نمود:

همه واکسن های موجود در کشور، باید در دو نوبت تزریق شوند. فاصله دو نوبت هم معمولاً چهار هفته است. پس تا هر دو نوبت را تزریق نکردید، به مقاوم شدن در برابر بیماری فکر نکنید.

وقتی واکسن وارد بدن می شود، سیستم ایمنی را تحریک می کند. با تحریک و واکنش سیستم ایمنی، مقاومت بدن در مقابل ویروس کرونا افزایش می یابد. برای اینکه این واکنش به طور کامل در بدن ایجاد شود، لازم است حداقل دو هفته از نوبت دوم تزریق گذشته باشد. بنابراین اگر شما واکسن ها را به موقع تزریق کنید، تا دو هفته پس از نوبت دوم واکسن هم باید همه اصول فاصله گذاری اجتماعی، زدن ماسک، شستن دست و ... را به طور کامل رعایت کنید.

اثر بخشی واکسن برای جلوگیری از بیماری صد در صد نیست. یعنی فرد واکسن زده هم ممکن است که بیماری کرونا بگیرد و آن را به دیگران انتقال دهد. اگرچه احتمال بیماری شدید و مرگ در افراد واکسن زده بسیار کمتر از دیگران است. پس هر چه تعداد افرادی که واکسن می زنند بیشتر شود، مقاومت جامعه در برابر ویروس کرونا افزایش می یابد.



salamat.gov.ir



خطر‌ها و عوارض واکسن:

واکسن‌ها با روش‌های پیچیده علمی و نظارت‌های دقیق تولید می‌شوند. در مطالعه‌های بالینی، بی‌خطری و اثربخشی واکسن‌ها دقیقاً بررسی می‌شود. این امر باعث می‌شود که کمترین میزان خطر و عوارض برای گیرندگان وجود داشته باشد.

موضوع مهم درباره واکسن کووید ۱۹ این است که فواید آن در حفظ سلامت، صدها برابر بیشتر از عوارض احتمالی واکسیناسیون و نیز خطر ابتلا به کووید ۱۹ است. چون واکسن سیستم ایمنی بدن انسان را تحریک می‌کند، می‌تواند سبب بروز برخی واکنش‌های ناخواسته و یا عوارض شود. شایع‌ترین عوارض پس از تزریق واکسن عبارتند از درد، قرمزی و سفتی مختصر محل تزریق، تب، احساس خستگی، درد و کوفتگی بدن. خوشبختانه این عوارض معمولاً زودگذر هستند و خودبخود بهبود پیدا می‌کنند. در موارد خیلی نادر ممکن است برخی مشکلات شدیدتر دیده شود که برخی از آنها به دلیل واکسن باشند.

اگر پس از تزریق واکسن کووید ۱۹ به‌علایم موضعی یا تب و بدن درد شدید دچار و یا اگر این عوارض بیشتر از ۳ روز ادامه یافت، حتماً به پزشک یا پایگاه‌های واکسیناسیون مراجعه نمایید.

کارکنان بهداشتی در مرکز و یا پایگاه واکسیناسیون آماده پاسخگویی به سوالات و آرایه راهنمایی‌ها و خدمات لازم هستند. همچنین شما می‌توانید در صورت رویارویی با عوارض جانبی، آن‌ها را در بخش ثبت عوارض جانبی سامانه salamat.gov.ir بنویسید.